

MIRAVIT® BufferPill

ERGÄNZUNGSFUTTERMITTEL IN FORM EINER KAPSEL FÜR KÄLBER MIT TRINKUNLUST

EINSATZBEREICH UND VORTEILE

Bei Blutacidose junger Kälber, verursacht durch:

- ✓ Phasen besonderer Belastung
- ✓ Durchfallgeschehen



ZUSAMMENSETZUNG (AUSWAHL)

Natriumbicarbonat, Gelatine (vom Schwein)

Stoffstrombilanz:

2,45 % N; 0,0 % P₂O₅

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

Durchfallgeschehen, auch therapiebegleitend

1. Tag: bis zu 3x täglich, im Abstand von 4 Stunden
2. Tag: morgens und abends je 1 Kapsel

Stresssituationen z.B. Transport

1. Tag: morgens und abends je 1 Kapsel

Je nach Verhalten der Tiere die Eingabe am folgenden Tag fortsetzen. Die Kapseln werden den Kälbern mittels des Eingebers auf den Zungengrund gelegt.

Zu Milchmahlzeiten sollte ein Abstand von 1-2 Std. vorher oder nachher, eingehalten werden. Auf Abschlucken achten!

! Tipp: Zur Vermeidung der Übertragung von Krankheitserregern ist der Kapseleingaber nach jeder Eingabe gründlich zu reinigen.

HALTBARKEIT

18 Monate nach Herstellungsdatum

ABPACKUNG

Dose mit 50 Kapseln

Die Angaben dieser Produktinformation stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, Erfahrungen und gesetzlichen Auflagen. Sie beschreibt den Einsatz des Produktes unter üblichen Betriebsverhältnissen und einer ordnungsgemäßen Lagerung. Für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.