

MIRAVIT® Carotin 4000


ERGÄNZUNGSFUTTERMITTEL ZUR BESSERTEN β -CAROTINVERSORGUNG VON MILCHKÜHEN, JUNGRINDERN UND SAUEN

EINSATZBEREICH UND VORTEILE

- ✓ unzureichende β -Carotinversorgung aus dem Grundfutter (z. B. überwiegende Maissilagefütterung an Milchkühe)
- ✓ Fruchtbarkeitsprobleme (schlechte und zu kurze Brunst), keine Brunsterscheinungen, hohe Rate an umrindernden bzw. umrauschenden Tieren

Funktion:

- ✓ verbessert bei unzureichenden β -Carotingehalten im Futter (z. B. Maissilage) die Carotinversorgung der Tiere
- ✓ führt zu besseren Brunsterscheinungen und Befruchtungsergebnissen
- ✓ Stabilisierung der Leistungsfähigkeit durch einen hochwertigen Vitaminkomplex



ZUSAMMENSETZUNG (AUSWAHL)

Weizenmehl, Natriumchlorid, Magnesiumoxid, Calciumcarbonat, Sonnenblumenöl raffiniert

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg:

4.000 mg Beta-Carotin; 150.000 IE Vitamin A; 4.000 mg Vitamin E

Stoffstrombilanz:

1,01 % N; 0,63 % P₂O₅

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

Milchkühe:

- bei unsicherer Versorgungslage: 75 g/Kuh/Tag
- bei extremer Mangelsituation: 125 g/Kuh/Tag

Einsatzzeitraum:

- von 2 Wochen vor dem Abkalbetermin bis zur Feststellung einer erneuten Trächtigkeit
- Umrindern: vom Tag des Umbullens bis 3 Wochen nach erfolgreicher Wiederbelegung

Zuchtbullen:

70g pro Bulle und Tag, bevorzugt während der Wintermonate

Zuchtsauen:

50g – 75g pro Sau und Tag 1 Woche vor bis 3 Wochen nach dem Absetzen

HALTBARKEIT

180 Tage nach Herstellungsdatum

ABPACKUNG

25 kg Sack

Die Angaben dieser Produktinformation stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, Erfahrungen und gesetzlichen Auflagen. Sie beschreibt den Einsatz des Produktes unter üblichen Betriebsverhältnissen und einer ordnungsgemäßen Lagerung. Für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.